

PRIMA NIDIFICAZIONE CON SUCCESSO DI CICOGNA NERA *Ciconia nigra* NEL LAZIO

MASSIMO BRUNELLI^(1*), ALESSANDRO MONTEMAGGIORI^(1,2), GUIDO PROLA⁽³⁾
& LORENZO SESTIERI⁽⁴⁾

⁽¹⁾ S.R.O.P.U. – Via Britannia, 36 – 00183 Roma (RM)

⁽²⁾ Dip. Biologia e Biotecnologie “C. Darwin” – Univ. di Roma “La Sapienza” (RM)

⁽³⁾ Via Roma, 70 – 00066 Manziana (RM)

⁽⁴⁾ Piazza Margana, 39 – 00186 Roma (RM)

*Autore per la corrispondenza: mss.brunelli@tin.it

Nel 2002 fu riscontrato il primo tentativo di nidificazione di Cicogna nera *Ciconia nigra* nel Lazio. Negli anni successivi, nella stessa area, altri tentativi si sono succeduti con relativa regolarità, e almeno quattro sono i nidi che la specie ha costruito *in situ*. L'area interessata è caratterizzata dalla presenza di un vallone fluviale profondamente inciso tra pareti tufacee, in buona parte ricoperte da ricca vegetazione rupicola e circondato da estese aree con foreste di latifoglie termofile, pascoli e colture cerealicole; l'area, posta a circa 150 m s.l.m., ricade all'interno della ZPS “Comprensorio Tolfetano-Cerite-Manziate”, in provincia di Viterbo (Brunelli, 2005, 2011).

Il 5 luglio 2014, durante un sopralluogo nella zona, due di noi (A.M. e L.S.) hanno rinvenuto un nuovo nido con 4 pulli di Cicogna nera dell'età di circa 30-35 giorni, uno dei pulli era sensibilmente più piccolo e successivamente è deceduto. L'andamento della nidificazione è stato monitorato fino all'involo dei 3 giovani rimasti, avvenuto intorno al 10 agosto. Il nido è stato costruito su un grosso tronco di Leccio *Quercus ilex* sviluppatosi in modo orizzontale a ridosso di una delle pareti tufacee presenti nel vallone (Fig. 1).



Fig. 1. Il nido di Cicogna nera rinvenuto nel Lazio nel 2014 (Foto L. Sestieri).

Questa è la prima nidificazione con successo di Cicogna nera nel Lazio, in precedenza i tentativi si erano infatti sempre interrotti precocemente e non erano mai andati oltre la fase di costruzione del nido, dal 2002 la specie ha comunque occupato costantemente l'area ma, quasi sempre, con un solo individuo (Bordignon et al., 2007, 2010).

L'evento descritto, oltre a confermare la grande rilevanza ornitologica del comprensorio dei Monti della Tolfa (Cecere et al., 2011; Sarrocco & Sorace, 2011), potrebbe essere propedeutico alla formazione di un nucleo nidificante in Italia centrale. Fino ad ora la Cicogna nera ha infatti nidificato con successo in due sub areali disgiunti e distanti tra loro, uno settentrionale localizzato in Piemonte e uno meridionale localizzato tra Campania, Puglia e Basilicata (Brichetti & Fracasso, 2013).

Summary

First successful reproduction of Black Stork *Ciconia nigra* in Latium (Central Italy)

Since 2002 Black stork attempted to breed unsuccessfully in a deep forested canyon in Viterbo's Province (Latium). On 10.08.2014 three juveniles successfully left a big nest built on *Quercus ilex* grown up on a side of the canyon. It is the first time the species successfully reproduces in Central Italy, while present only in Piedmont (N. Italy) and in Campania, Apulia and Basilicata (S. Italy).

BIBLIOGRAFIA

- Bordignon L., Brunelli M., Caldarella M., Fraissinet M., Marrese M., Rizzi V. & Visceglia M., 2010. Rapporto sulla nidificazione della Cicogna nera *Ciconia nigra* in Italia (2008-2010). Alula, XVII (1-2): 133-134.
- Bordignon L., Brunelli M. & Visceglia M., 2007. Nuovi dati sulla nidificazione della Cicogna nera *Ciconia nigra* in Italia. Alula, XIV (1-2): 124-125.
- Bricchetti P. & Fracasso G., 2013. Ornitologia Italiana. Vol. 1. Versione elettronica. Oasi Alberto Perdisa, Bologna.
- Brunelli M., 2005. La Cicogna nera nel Lazio. In: Bordignon L. (red). La Cicogna nera in Italia. Parco Naturale del Monte Fenera. Tipolitografia di Borgosesia s.a.s., Borgosesia (VC): 95-109.
- Brunelli M., 2011. Cicogna nera *Ciconia nigra*. In: Brunelli M., Sarrocco S., Corbi F., Sorace A., Boano A., De Felici S., Guerrieri G., Meschini A. & Roma S. (a cura di). Nuovo Atlante degli Uccelli Nidificanti nel Lazio. Edizioni ARP (Agenzia Regionale Parchi), Roma: 103.
- Cecere J.G., Brunelli M. & Sarrocco S. (a cura di), 2011. La conservazione degli uccelli nei Monti della Tolfa. Edizioni Belvedere (Latina), "le scienze" (14), 128 pp.
- Sarrocco S. & Sorace A., 2011. La ricchezza di specie delle aree protette e delle ZPS ed il loro valore ornitologico. In: Brunelli M., Sarrocco S., Corbi F., Sorace A., Boano A., De Felici S., Guerrieri G., Meschini A. & Roma S. (a cura di). Nuovo Atlante degli Uccelli Nidificanti nel Lazio. Edizioni ARP (Agenzia Regionale Parchi), Roma: 417-426.